

INSTITUT ZA DUVAN
Beograd


PREPORUKA ZA PRIMENU AGROSTEMINA NA DUVANU TIPU "BURLEY"

Na osnovu četvorogodišnjih ispitivanja uticaja bioregulatora Agrostemina na duvanu tipa Berlej može se konstatovati sledeće:

*Najbolji rezultati postignuti su prskanjem duvanskih biljaka u fazi porasta od devetog do jedanaestog lista u koncentraciji od 75 g/ha **AGROSTEMIN**[®] - "zlatni", odnosno, 750 g/ha **AGROSTEMIN**[®] - "zeleni".*

Za prskanje 1 ha potrebno je naznačene količine Agrostemina rastvoriti u 600 litara vode.

ODGOVORNI ISTRAŽIVAČ,


Dragana Maričić, dipl. hem. sp.



DIREKTOR INSTITUTA,


dr Lazar Nikolić

Primena: po pravilu, **tri puta** u toku sezone.

Prvi put: sa semenom (potopiti u rastvor odnosno zaprašiti*) sa **30 g "zlatnog"**, ili, rasad isprskati sa razmućenih **30 g "zlatnog"** ili **300 g "zelenog"** po hektaru rasadnika u fazi "ukorenjivanja rasade" (1 – 3 lista)

Drugi put: isprskati 3–7 dana nakon rasađivanja sa **75 g/ha "zlatnog"** ili **750 g/ha "zelenog"**, deljenjem razmućene količine praška na već pripremljen za hektar površine rastvor drugih preparata (ne zahteva zaseban prolaz), odnosno, na količinu vode potrebnu za **prskanje jednog hektara**.

Treći put: isprskati u fazi 9-11 lista, prema uputstvu datom u predhodnom pasusu.

Preporuka: u ostalim rokovima, istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava prskati sa 150 g/ha **"zelenog"** (ili 15 g/ha **"zlatnog"**) radi uspešnijeg oporavka

POTPUNO JE BEZOPASAN ZA LJUDE, ŽIVOTINJE (UKLJUČUJUĆI I PČELE) I PRIRODNU SREDINU;
NE ZAHTEVA POSEBNE MERE HTZ **)

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Rešenje br 321-01-01175/2009-11 od 08.02.2010.

*) planiranu količinu semena za setvu jednog hektara **rasadnika**

**) Rešenje br 3/2-08-9291/02 od 13.01.03. Saveznog sekretarijata za rad, zdravstvo i socijalno staranje