



## R U Ž A

( *Rosa L.* )

### Proizvodnja podloga

#### Iz semena

- Način primene, vreme i količina
  - ❖ u pripremi za setvu – prašak  
*pre odlaganja u pesak, seme pomešati sa 30\* g/ha "zlatnog"*
  - ❖ nega sejanaca (prva–druga godina) vodenom suspenzijom
    - prvi put – sa 30 g/ha "zlatnog" (300 g/ha "zelenog")  
po otvaranju lisnih pupoljaka*
    - drugi put – istom količinom u vreme pred uobičajeno za cvetanje*
    - treći put – krajem sezone (duplu dozu)*
  - ❖ vađenje i presađivanje  
*potopiti u voden rastvor 1,5g "zlatnog" (15g "zelenog")  
na 10l vode*

#### Reznicama (ožiljavanje)

- Način primene, vreme i količina  
*reznice potopiti u voden rastvor 1,5g "zlatnog" (15g "zelenog")  
na 10l vode i ili prpilište (korenilište) zaliti sa 30 g/ha "zlatnog"  
(300 g/ha "zelenog")*

#### Efekti

- bolja klijavost i energija klijanja
- bolje ukorenjavanje – snažan neuobičajeno razvijen korenov sistem
- bujnije bokorenje
- veći broj snažnih, dužih izbojaka
- veća zastupljenost sadnog materijala I klase
- uspešnije prezimljavanje

\* na količinu semena planiranu za zasejavanje jednog hektara

# AGROSTEMIN



Proizvodnja sadnica (kalemova)

dr. Danilo Gajić

Način primene, vreme i količina

- ❖ vađenje i presađivanje sejanaca/ožiljenih reznica

*pre sadnje držati potopljene u rastvoru 1,5g "zlatnog"  
(15g "zelenog") na 10l vode*

- ❖ nega presađenih sejanaca/ožiljenih reznica

*prvi put – po izbijanju lisnih pupoljaka zaliti / isprskati  
sa 30 g/ha "zlatnog" (300 g/ha "zelenog")*

*drugi put – pred kalemljenje podloge zaliti / isprskati  
sa 30 g/ha "zlatnog" (300 g/ha "zelenog")*

- ❖ kalemljenje

*priprema grančica za kalemljenje – držati ih potopljene u rastvoru 1,5g  
"zlatnog" (15g "zelenog") na 10l vode ili krpu u kojoj se čuvaju do  
kalemljenja ovlažiti navedenom suspenzijom*

- ❖ nega kalema–sadnica

*po formirajući lisne mase na kalemima, odnosno, bilo u vreme prvog  
prehranjivanja ili prskanja zaštitnim sredstvima, zaliti sa 30 g/ha  
"zlatnog" (300 g/ha "zelenog")*

- ❖ priprema za vađenje i presađivanje/prezimljavanje

*u sklopu uobičajenih mera koje se sprovode u cilju uspešnijeg  
prezimljavanja prskati sa 60 g/ha "zlatnog" (600 g/ha "zelenog")*

- ❖ pakovanje za transport

*masu kojom je sadnici obezbeđena vлага tokom transporta navlažiti  
rastvorom 1,5g "zlatnog" (15g "zelenog") na 10l vode*

## Efekti

- uspešnije presađivanje – prijem podloga i sadnica
- veći procenat kalema koji su se primili
- bujnije bokorenje
- veći broj snažnih izbojaka
- zadebljali vrat korena
- veća zastupljenost sadnog materijala I klase
- pogodnija za transport i čuvanje
- uspešnije prezimljavanje

# AGROSTEMIN



Proizvodnja rezanog cveta

dr. Danilo Gajić

## Način primene, vreme i količina

- prijem i odlaganje sadnica do trenutka sadnje  
*po preuzimanju, držati ih potopljene u rastvoru 1,5g "zlatnog" (15g "zelenog") na 10l vode radi oporavka*
- sa 30 g/ha "zlatnog" (300 g/ha "zelenog") zaliti
  - ❖ kad krenu da se otvaraju lisni pupoljci
  - ❖ pred cvetanje, odnosno, po formiranjem lisne mase
  - ❖ istovremeno sa prihranjivanjem i sa sredstvima za zaštitu (polu od preporučene doze)
  - ❖ nakon rezanja cveta
  - ❖ pri kraju vegetativne sezone (bolje prezimljavanje)

## Efekti

- uspešnije ukorenjavanje
- bujnije bokorenje i cvetanje
- veći broj snažnih izbojaka
- veći procenat cvetova sa dužom i snažnijom drškom
- intenzivnija boja i miris
- pogodnija za transport i čuvanje
- uspešnije prezimljavanje

Napomena: **AGROSTEMIN®** je kompatabilan sa svim drugim sredstvima koja se primenjuju u poljoprivredi putem vodene suspenzije – ne zahteva zaseban prolaz.

Potpuno je bezopasan za ljude, životinje (uključujući i pčele) i prirodnu sredinu;  
ne zahteva posebne mere HTZ\*)

**AGROSTEMIN®** je sredstvo za ishranu bilja na bazi biljnih ekstrakta\*\*

\*) Rešenje br 3/2-08-9291/02 od 13.01.2003. Saveznog sekretarijata za rad, zdravstvo i socijalno staranje

\*\*) Rešenje br 321-01-01175/2009-11 od 08.02.2010. Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RSrbije