



Dr. Danica Gajić

AGROSTEMIN®

povećava prinos
poljoprivrednih kultura od 5% do 15% (i više)

AGROSTEMIN®

poboljšava kvalitet
proizvoda

AGROSTEMIN®

smanjuje izdatke
za đubrivo od 20% do 30%

KAKO ?

Veća energija klijanja – ujednačeno, brže **nicanje**

Duži i bogatiji – efikasniji **koren**

Snažniji, sa više hlorofila **nadzemni deo**

Kvalitetnija **ishrana**
(razmena mineralnih i ostalih materija)

Poboljšana **otpornost**
na bolesti, štetočine i vremenske nepogode

AGROSTEMIN®

nije đubrivo – nije pesticid – nije hormon

AGROSTEMIN®

je **SREDSTVO ZA ISHRANU^{*)}** prirodnog porekla
koje sadrži biljne ekstrakte

AGROSTEMIN®

je potpuno **bezopasan** za ljude, životinje
(uključujući pčele) i prirodnu sredinu^{**)}

AGROSTEMIN®

ne zahteva posebne mere higijensko
tehničke zaštite^{**)}

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA

Na tržištu su prisutni brojni plagijati preparata **AGROSTEMIN®**, sa sličnim (koren reči je "stemin") ili istovetnim imenom.

U zavisnosti od proizvođača do proizvođača data su i različita uputstva za upotrebu (doze, način i vreme upotrebe).

Iz tih razloga se kompanija "AGROSTEMIN"-Beograd, proizvođač **AGROSTEMIN®-a**, odlučila da na svoja pakovanja, kao znak koji će nas razlikovati od drugih i biti garant našeg kvaliteta, stavi potpis autora i pronalazača bioregulatora Agrostemina – dr Danice Gajić.

AGROSTEMIN® "sa potpisom" ima sebi svojstvena pravila za korišćenje (doze, način i vreme primene). Molimo korisnike za strpljenje i da **pazljivo**, pre upotrebe, prouče ovo Uputstvo.

^{*)} Rešenje br 321-01-01175/2009-11 od 08.02.2010.
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Republike Srbije

^{***)} Rešenje br 3/2-08-9291/02 od 13.01.03.
Saveznog sekretarijata za rad, zdravstvo i socijalno staranje

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

(sertifikovan za upotrebu i u organskoj proizvodnji)

AGROSTEMIN® se dodaje bilo semenu, bilo biljkama, bilo zemljištu, već u zavisnosti od raspoložive mehanizacije, vrste poljoprivredne kulture i faze njenog razvoja u trenutku primene.

PRAŠAK (zapašivanje) se koristi pri doradi/pripremi semena za setvu:

30 g ⇒ na količinu semena po hektaru

VODENI RASTVOR (pripremljen prema uputstvu str 9) raspoređuje se na broj prskalica (punjenja) potrebnih za prskanje kulture, ili, pod posebnim uslovima u doradi/pripremi semena za setvu:

rastvorenih 30 g ⇒ za prskanje 1. ha pod kulturom

Koliko puta prskati, u toku jedne sezone (obavezno+preporučeno), dato je u **Tabela 1**, za 50 karakterističnih poljoprivrednih kultura.

Kako i kada to učiniti, odnosno, detaljno uputstvo u kojim vegetativnim fazama razvoja i koliko primeniti **AGROSTEMIN®**, dato je posebno, za svaku od kultura na odgovarajućoj strani (Tabela 1–kolona "Str").

U poglavlju "**VAŽNO !**" (str 9) dato je sve što je potrebno znati da bi se postiglo maksimalno povećanje prinosa.

Uz svako pakovanje je **posuda** za brzo i lako odmeravanje željene količine **AGROSTEMIN®-a**. U zavisnosti od veličine pakovanja, to je:

čša za rakiju (V=0,05 l) = **1 hektar**

bokal (V=0,50 l) = **10 hektara**

bokal (V=1,00 l) = **20 hektara**

Znači:

30 g AGROSTEMIN®-a = 1 ha pod kulturom

čšaica AGROSTEMIN®-a = 1 ha pod kulturom

½ bokala AGROSTEMIN®-a = 10 ha pod kulturom

300 g = 10 čšaica = ½ bokala = 10 ha pod kulturom

PROIZVODI:

"Agrostemin" d.o.o., Beograd
Kralja Milutina 26

tel/fax: 381 (11) 268 26 64
mob: 381 (64) 147 80 08

e-mail: office@agrostemin.com
www.agrostemin.com



Dr. Danilo Gajić

Tabela 1

Kultura	Str	Broj prskanja		Povećanje	Kultura	Str	Broj prskanja		Povećanje		
		obaveznih (♥)	poželjnih (♡)				obaveznih (♥)	poželjnih (♡)			
B	blitva	3	2	1	1.600–2.800 kg/ha	L	luk beli	6	2	1	400–1.000 kg/ha
	boranija	3	1	1	500–1.000 kg/ha		luk crni	6	2	1	2.000–3.000 kg/ha
	breskva	3	2	1	do 2.000 kg/ha	M	malina	6	2	1	do 2.000 kg/ha
C	cveće	3					mušmula	6	2	1	do 800 kg/ha
	cvekla	3	2	1	1.500–3.000 kg/ha	O	ovas	6	2	1	400–600 kg/ha
D	detelina	3	1	1	do 20 %	P	paprika	6	2	1	2.000–3.500 kg/ha
	dinja	3	2	2	do 15 %		paradajz	6	2	1	10.000–15.000 kg/ha
	duvan	3	3	1	do 20 %		pasulj	6	1	1	100–300 kg/ha
G	grašak	4	1	1	1.000–2.000 kg/ha		peršun	7	2	1	700–1.200 kg/ha
	grožđe (loza)	4	3	1	2.000–8.800 kg/ha		pirinač	7	2	1	400–600 kg/ha
J	jabuka	4	2	2	do 3.000 kg/ha	pšenica	7	2	1	400–600 kg/ha	
	jagoda	4	2	1	do 1.000 kg/ha	R	raž	7	2	1	do 15 %
	ječam	4	2	1	do 12 %		rotkvice	7	2	1	1.500–3.000 kg/ha
K	kajsija	4	2	1	do 800 kg/ha	S	salata	7	2	1	2.000–3.500 kg/ha
	karfiol	4	2	1	2.000–3.000 kg/ha		soja	7	2	1	200–500 kg/ha
	keleraba	4	2	1	2.500–3.200 kg/ha		spanać	7	2	1	1.500–2.500 kg/ha
	kelj	5	2	1	1.800–2.500 kg/ha		suncokret	8	2	1	200–300 kg/ha
	krastavac	5	2	2	9.000–11.000 kg/ha	Š	šargarepa	8	2	1	2.000–4.000 kg/ha
	krompir	5	2	1	3.000–9.000 kg/ha		šećerna repa	8	2	1	2.750–8.800 kg/ha
	kruška	5	2	1	do 3.000 kg/ha		šećerna trska	8			
	kukuruz	5	2	1	400–800 kg/ha	šljiva	8	2	1	do 1.200 kg/ha	
	kupina	5	2	1	do 1.000 kg/ha	T	trava livadska	8	1	1	do 20 %
	kupus	5	2	1	3.000–6.000 kg/ha		trešnja	8	2	1	do 800 kg/ha
L	lubenica	5	2	2	do 15 %	V	višnja	8	2	1	do 800 kg/ha



BLITVA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili u fazi od 2 do 3 lista			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♡

- povećan sadržaj suve materije;
- prinos veći za: od 5% do 10%.

BORANIJA

Dr. Danilo Gajić

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♡

- izraženija sortna boja;
- zelena masa biljaka veća za 20%;
- povećan procenat šećera;
- prinos veći za: od 5% do 20%.

BRESKVA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prskanje ⇔ u fazi pojave – razvoja lista			♥
II	prskanje ⇔ pred cvetanje			♥
III	prskanje ⇔ nakon cvetanja			♡


- povećan procenat šećera;
- izraženija sortna boja;
- veća zastupljenost prve klase plodova;
- pogodnija za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

CVEKLA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ 30 dana od nicanja			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♡

- povećan sadržaj suve materije;
- pogodnija za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

CVEĆE



DETELINA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ nakon otkosa			♡

- povećan sadržaj karotina i drugih korisnih materija;
- prinos veći za: od 5% do 20%.

DINJA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ pred cvetanje			♡
IV	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♡

- povećan procenat šećera;
- sazreva 7 do 10 dana ranije;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

DUVAN

	KAKO ⇔	KADA ⇔	75 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme (30 g/ha) ili prskanje ⇔ u fazi "ukrštanje listova" ("Virdžinija"), odnosno, "podizanja ušiju" ("Burley")			♥
II	prskanje ⇔ 3 – 7 dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ u fazi porasta 9 – 11 lista			♥
IV	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♡

- prinos suve lisne mase veći za: od 15% do 20%.
- poboljšani randman klasa (veća zastupljenost I–III)



GRAŠAK

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ili potapanje u rastvor ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- izraženija sortna boja;
- zelena masa biljaka veća za 20%;
- povećan procenat šećera;
- prinos veći za: od 5% do 20%.

JABUKA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prskanje ⇔ u fazi "mišije uši"			♥
II	prskanje ⇔ pred cvetanje			♥
III	prskanje ⇔ pred pojavu boje / berbu			♥

- povećan sadržaj šećera i suve materije;
- izraženija sortna boja;
- veća zastupljenost prve klase plodova;
- pogodnija za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

JEČAM

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju)			♥
II	prskanje ⇔ između bokorenja i vlatanja			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- ranije sazrevanje;
- poboljšan kvalitet zrna za preradu u industriji piva, kao i kvalitet stočnog ječma;
- prinos veći za: od 5% do 12%.

KARFIOL

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili u fazi od 2 do 3 lista			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7 dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- povećan sadržaj šećera i suve materije;
- prinos veći za: od 5% do 10%.

GROŽĐE (vinova loza)

Dr. Danilo Gajić

	KAKO ⇔	KADA ⇔	45 g/ha	X
I	prskanje ⇔ 10 dana pred cvetanje			♥
II	prskanje ⇔ 10 dana nakon cvetanja			♥
III	prskanje ⇔ 10 dana pred "šarak" grožđa			♥

- povećan sadržaj šećera, karotina i antocijana;
- izraženija sortna boja;
- poboljšana mehanička svojstva bobice i grozda;
- pogodnije za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

JAGODA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prskanje ⇔ na početku vegetacije (u proleće) a rasad pre sadnje držati 30 minuta potopljen u rastvoru pripremljenom za II prskanje			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7 dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ pred cvetanje i tokom berbe			♥

- povećan procenat šećera;
- poboljšana mehanička svojstva ploda;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

KAJSIJA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prskanje ⇔ u fazi pojave – razvoja lista			♥
II	prskanje ⇔ pred cvetanje			♥
III	prskanje ⇔ nakon cvetanja			♥

- povećan procenat šećera;
- izraženija sortna boja;
- veća zastupljenost prve klase plodova;
- pogodnija za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

KELERABA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili u fazi od 2 do 3 lista			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7 dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- povećan sadržaj šećera i suve materije;
- prinos veći za: od 5% do 10%.



Dr. Danilo Gajić

KELJ

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili u fazi od 2 do 3 lista			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♡

- prinos veći za: od 5% do 10%.

KRASTAVAC

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili u fazi od 2 do 5 lista			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♡
IV	prskanje ⇔ tokom berbe			♡

- prinos veći za: od 5% do 20%.

KROMPIR

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ili potapanje u rastvor ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ pred cvetanje			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♡

- pogodniji za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

KRUŠKA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prskanje ⇔ u fazi "mišije uši"			♥
II	prskanje ⇔ pred cvetanje			♥
III	prskanje ⇔ pred pojavu boje / berbu			♡

- povećan procenat šećera;
- izraženija sortna boja;
- veća zastupljenost prve klase plodova;
- pogodnija za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

KUKURUZ

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju)			♥
II	prskanje ⇔ u fazi 4 do 5 pera			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♡

- ranije sazrevanje;
- viši kvalitet prinosa (veća zastupljenost sirovih proteina);
- prinos veći za: od 5% do 15%.

KUPINA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prskanje ⇔ na početku vegetacije (u proleće) a rasad pre sadnje držati 30 minuta potopljen u rastvoru pripremljenom za II prskanje			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ pred cvetanje i nakon berbe			♡

- povećan procenat šećera;
- poboljšana mehanička svojstva ploda;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

KUPUS

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili u fazi od 2 do 3 lista			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♡

- povećan sadržaj suve materije ("čvršći");
- povećan procenat šećera;
- prinos veći za: od 5% do 10%.

LUBENICA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ pred cvetanje			♡
IV	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♡

- povećan procenat šećera;
- sazreva 7 do 10 dana ranije;
- prinos veći za: od 5% do 15%.



Dr. Danilo Gajić

LUK BELI

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ 30 dana od nicanja			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- pogodniji za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 10%.

LUK CRNI

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ 30 dana od nicanja			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- izraženija sortna boja;
- pogodniji za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 10%.

MALINA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prskanje ⇔ na početku vegetacije (u proleće) a rasad pre sadnje držati 30 minuta potopljen u rastvoru pripremljenom za II prskanje			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ pred cvetanje i nakon berbe			♥

- povećan procenat šećera;
- poboljšana mehanička svojstva ploda;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

MUŠMULA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prskanje ⇔ u fazi pojave – razvoja lista			♥
II	prskanje ⇔ pred cvetanje			♥
III	prskanje ⇔ nakon cvetanja			♥

- povećan sadržaj suve materije;
- povećan procenat šećera;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

OVAS

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju)			♥
II	prskanje ⇔ između bokorenja i vlatanja			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- usevi otporniji na poleganje, ranije sazrevanje;
- poboljšan kvalitet zrna;
- prinos veći za: od 5% do 10%.

PAPRIKA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili u fazi od 2 do 5 lista			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ tokom berbe			♥

- izraženija sortna boja;
- pogodnija za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 10%.

PARADAJZ

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili u fazi od 2 do 5 lista			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ tokom berbe			♥

- izraženija sortna boja;
- pogodniji za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 20%.

PASULJ

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ili potapanje u rastvor ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- izraženija sortna boja;
- zelena masa biljaka veća za 20%;
- povećan procenat šećera;
- prinos veći za: od 5% do 20%.



Dr. Danilo Gajić

PERŠUN

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ 30 dana od nicanja			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- povećan sadržaj suve materije;
- pogodniji za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

PIRINAČ

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ tokom cvetanja			♥
III	prskanje ⇔ posle klasanja			♥

- ranije sazrevanje;
- viši kvalitet prinosa;
- prinos veći za: od 10% do 40% (Kina).

PŠENICA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju)			♥
II	prskanje ⇔ između bokorenja i vlatanja			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- usevi otporniji na poleganje, ranije sazrevanje;
- viši kvalitet prinosa;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

RAŽ

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju)			♥
II	prskanje ⇔ između bokorenja i vlatanja			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- usevi otporniji na poleganje, ranije sazrevanje;
- viši kvalitet prinosa;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

ROTKVICA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ 30 dana od nicanja			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- izraženija sortna boja;
- pogodnija za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

SALATA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili u fazi 2-3 lista			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7 dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- povećan sadržaj suve materije;
- povećan procenat šećera;
- prinos veći za: od 5% do 10%.

SOJA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili u fazi 2 do 6 listića			♥
II	prskanje ⇔ 10 dana pred cvetanje			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- viši kvalitet prinosa (povećan sadržaj ulja, veći ukupan prinos sirovih ulja i sirovih proteina);
- prinos veći za: od 5% do 20%.

SPANAC

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili u fazi od 2 do 3 lista			♥
II	prskanje ⇔ 3 do 7 dana po rasađivanju			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- povećan sadržaj suve materije;
- prinos veći za: od 5% do 10%.

preporuka ⇔ ♥

obavezno ⇔ ♥



SUNCOKRET

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili u fazi 2 do 4 listića			♥
II	prskanje ⇔ 10 dana pred cvetanje			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥

- viši kvalitet prinosa (povećan sadržaj ulja, veći ukupan prinos sirovih ulja i sirovih proteina);
- prinos veći za: od 5% do 20%.

ŠARGAREPA

Dr. Danilo Gajić

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ 30 dana od nicanja			♥
III	prskanje ⇔ istovremeno sa primenom hemijskih zaštitnih sredstava (pola od uobičajene doze)			♥


- više karotina
- pogodnija za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

ŠEĆERNA REPA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30-150 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme (30 g/ha) ili prskanje ⇔ pre nicanja (zemlju) ili tokom "linjanja" (u fazi 6 do 12 listova)			♥
II	prskanje ⇔ nakon "sklapanja redova"			♥

- smanjen "plavi broj";
- podiže digestiju za 1% do 2% (oko 500kg/ha šećera)
- veći prinos polarizacionog šećera;
- prinos veći za: od 5% do 10%.

ŠEĆERNA TRSKA



ŠLJIVA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prskanje ⇔ u fazi pojave – razvoja lista			♥
II	prskanje ⇔ pred cvetanje			♥
III	prskanje ⇔ nakon cvetanja			♥

- povećan sadržaj suve materije;
- povećan procenat šećera;
- izraženija sortna boja;
- veća zastupljenost prve klase plodova;
- pogodnija za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%.

TRAVA LIVADSKA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prašak ⇔ seme ili prskanje ⇔ pre ili nakon nicanja			♥
II	prskanje ⇔ nakon otkosa			♥

- povećan sadržaj karotina i drugih korisnih materija;
- prinos veći za: od 5% do 20%.

TREŠNJA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prskanje ⇔ u fazi pojave – razvoja lista			♥
II	prskanje ⇔ pred cvetanje			♥
III	prskanje ⇔ nakon cvetanja			♥

- povećan procenat šećera;
- izraženija sortna boja;
- veća zastupljenost prve klase plodova
- pogodnija za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%

VIŠNJA

	KAKO ⇔	KADA ⇔	30 g/ha	X
I	prskanje ⇔ u fazi pojave – razvoja lista			♥
II	prskanje ⇔ pred cvetanje			♥
III	prskanje ⇔ nakon cvetanja			♥

- povećan procenat šećera;
- izraženija sortna boja;
- veća zastupljenost prve klase plodova
- pogodnija za transport i čuvanje;
- prinos veći za: od 5% do 15%

Dr. Danilo Gavrić

KORIŠĆENJE VODENOG RASTVORA

Priprema:

- da bi razmutio tri čašice (oko 100 g) **AGROSTEMIN**[®]-a, potrebno je 1 do 2 litra vode;
- u sračunatu količinu za pripremu rastvora hladne ili tople (do 60°C) vode sipaj planiranu količinu **AGROSTEMIN**[®]-a;
- intenzivno mešaj 5 do 10 minuta (do razbijanja eventualno nastalih grumuljica).

Primena:

– *putem prskalice:*

pripremljen koncentrovan rastvor rasporedi na ukupan broj punjenja prskalice, potreban da bi se pokrila površina pod kulturom za koju si ga (rastvor) pripremao.

– *za pripremu / doradu semena za setvu:*

Upozorenje: samo za poljoprivrednike sa bogatim opštim iskustvom u primeni "mokre" tehnologije pripreme/dorade semena pred setvu; daje najbolje rezultate!

ravnomerno isprskaj odgovarajuću količinu semena ili, najbolje, ukoliko je moguće, potopi ga u koncentrovani i rashlađeni (!) rastvor;

po isteku 10–20 min, seme prosuši do mere koja omogućuje neometano sejanje;

Saveti:

- ako je nedovoljno tečnosti, dodaj vode i naknadno dobro promešaj;
- vlaženje obavi neposredno pred sejanje, odnosno, zasej pre nego krene klica;
- vodi računa koje seme vlažiš, da tokom sejanja ne dođe do gnječenja.

ZAPRAŠIVANJE SEMENA

Primena:

- *zapaši seme onih kultura kod kojih nije dozvoljeno ili nije izvodljivo prskanje/potapanje u pripremi/doradi semena za setvu;*
- *pred mešanje, seme mora da je suvo;*
- *mešati sve dok se prah ravnomerno ne rasporedi po semenu.*
- *daje najbolje rezultate;*

VAŽNO!

Za pravilnu upotrebu i postizanje potpunog efekta **AGROSTEMIN**[®]-a važno je znati:

- sa primenom **AGROSTEMIN**[®]-a treba započeti na samom početku sezone one kulture na koju se baca (*najveće povećanje prinosa dobija se tamo gde postoje uslovi da se **AGROSTEMIN**[®] primeni u samom startu – već pri doradi/pripremi semena za setvu;*)
- površina (veličina) parcele pod kulturom na koju se dejstvuje, odnosno za koju se dorađuje seme, osnovna je mera (1ha=30g) za doziranje **AGROSTEMIN**[®]-a;

– **ukupan broj prskanja** dat je u **Tabela 1**, kao podsetnik, sa naznakom za koje kulture je obavezno **višeputno prskanje**, a za koje je poželjno (može, a ne mora) radi postizanja najvećeg povećanja prinosa;

– ukoliko je seme već dorađeno sa **AGROSTEMIN**[®]-om prvo prskanje može da se preskoči;

– za faze razvoja kod kojih je naznačena obavezna primena (♥) **AGROSTEMIN**[®]-a, a dejstvuje se i sa nekim od hemijskih sredstava, primeniti punu dozu!

– **primenljiv je istovremeno sa svim đubrivima, insekticidima, fungicidima i ostalim preparatima koji se koriste u poljoprivredi, a nanose se u obliku vodenog rastvora** (ne zahteva posebni prolaz, već može da se upotrebi jednovremeno sa drugim sredstvima, rastvornim u vodi);

– preporuka je (♥) da se, bez obzira na tip kulture, za faze razvoja u kojima se dejstvuje isključivo pesticidima (u **Tabela 1** nije naznačena konkretna faza) ide istovremeno i sa pola od uobičajene doze **AGROSTEMIN**[®]-a;

– pri pripremi rastvora **AGROSTEMIN**[®]-a pridržavati se pravila:

prvo u manjoj količini vode dobro razmutiti (prema uputstvu str 9), pa tek onda dodati u prskalicu (time se sprečava stvaranje grumuljica, odnosno, čepjenje dizni);

– neutrošeni vodeni rastvor **AGROSTEMIN**[®]-a poželjno je iskoristiti u roku od 15 do 30 dana; preostalu količinu **AGROSTEMIN**[®]-a u praškastom stanju dobro zatvoriti i čuvati na suvom;

– u slučaju da dođe do prekomernog doziranja, nema štetnih posledica – ali se umanjuje njegova "snaga";

– preko zemljišta, **AGROSTEMIN**[®] deluje i u narednoj sezoni, na iznova posejanu/zasađenu kulturu; sa stanovišta ulaganja i postizanja kompletnog efekta optimalno ga je primenjivati svake sezone a obavezno dve za redom; nakon sezone pauze, produženo dejstvo drastično opada i radi postizanja deklarisanog povećanja prinosa neophodno je nastaviti sa punom primenom (prema uputstvu) **AGROSTEMIN**[®]-a;

– **AGROSTEMIN**[®] je potpuno bezopasan za ljude, životinje (uključujući i pčele) i prirodnu sredinu; ne zahteva posebne mere higijensko tehničke zaštite;

– **AGROSTEMIN**[®] je sertifikovan za upotrebu i u organskoj proizvodnji;

– **AGROSTEMIN**[®] nije đubrivo, nije pesticid, nije hormon;

– **AGROSTEMIN**[®] je "glas" Prirode:

sačinjen od sirovina BILJNOG porekla.