

PRIMENA U VINOGRADARSTVU

(u proizvodnji grožđa i loznog sadnog materijala i u matičnjaku loznih podloga)

a) Primena u proizvodnji grožđa

Već duži niz godina **AGROSTEMIN**[®], sredstvo za ishranu bilja na bazi biljnih ekstrakta^{*)}, uspešno se primenjuje u proizvodnji vinskog i stonog grožđa, posebno kod sorti kao što su: Muskat hamburg, Kardinal, Afuz ali, Burgundac crni, Rkaciteli, Game crni, Merlo, Kaberne Frank i dr.

AGROSTEMIN[®] utiče na sledeća svojstva:

- rodni potencijal i prinos grožđa,
- mehanička svojstva grožđa i bobica,
- hemijske karakteristike grožđanog soka (sadržaj šećera, sadržaj ukupnih kiselina, sadržaj antocijana i dr.).

U zavisnosti od agroekoloških uslova lokaliteta i primenjene količine (30 do 45 g/ha "**profi**" ili 300 do 450 g/ha "**zelenog**"), **AGROSTEMIN**[®] povećava prinos grožđa u proseku od **10 - 30%**.

Višegodišnja ispitivanja su pokazala da **AGROSTEMIN**[®] najefikasnije deluje ako se primenjuje trokratno i to u određenim fenofazama razvoja vinove loze, odnosno sorte:

- 10 dana pre cvetanja vinove loze,
- 10 dana posle cvetanja vinove loze, i
- 10 dana pred šarak grožđa.

Pri trokратnoj primeni **postiže se**:

- povećanje mase grozda;
- povećanje mase i veličine bobica;
- povećan sadržaj antocijana u pokožici bobica i dr.

Šema primene **AGROSTEMIN[®]-a za postizanje navedenog (maksimalnog) spektra efekata:**

Tretiranje	D o z a		Feno faza razvoja vinove loze:
Prvo	45 g/ha " profi "	ili 450 g/ha " zelenog "	10 dana pre cvetanja sorte
Drugo	45 g/ha " profi "	ili 450 g/ha " zelenog "	10 dana posle cvetanja sorte
Treće	45 g/ha " profi "	ili 450 g/ha " zelenog "	10 dana pre šarka grožđa sorte
Svega:	135 g "profi"	ili 1 350 g "zelenog"	u sezoni, po hektaru vinograda

Priprema rastvora:

U sud sa čistom vodovodskom ili izvorskom vodom zagrejane na 50 - 60 stepeni Celzijusa, zapremine 5 - 6 litara treba, za jedan hektar vinograda sipati 45 g ("**profi**") ili 450 g ("**zelenog**") preparata. Smešu u sudu treba 5 - 10 minuta intenzivno mešati. Nakon toga se rastvor sipa u prethodno pripremljen rastvor sredstava za zaštitu vinove loze od bolesti i štetočina i intenzivno meša 10 minuta. Posle toga rastvor **AGROSTEMIN**[®]-a i sredstava za zaštitu vinove loze od bolesti i štetočina je pripremljen za upotrebu.

Za površinu manju od jednog hektara primenjuje se srazmerno manja količina preparata i rastvora.

AGROSTEMIN[®] se može koristiti istovremeno i sa sredstvima za folijarno prihranjivanje vinove loze.

S obzirom na striktnu primenu **AGROSTEMIN**[®]-a u određenoj feno fazi razvoja vinove loze, što se ne poklapa uvek sa vremenom primene sredstava za zaštitu od bolesti i štetočina, **AGROSTEMIN**[®] se u tom slučaju primenjuje u čistom rastvoru bez primese drugih sredstava - preparata.

^{*)} Rešenje br 321-01-02214/2019-11 od 10.02.2020. Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srbije

b) Primena u proizvodnji loznog sadnog materijala

U cilju povećanja procenta I klase kalemova vinove loze (i do 10 %) primeniti **AGROSTEMIN**[®], pri čemu se ispoljava i snažniji razvoj organa i kalemova.

AGROSTEMIN[®] se primenjuje folijarno, odnosno prskanjem lišća u loznom prporištu - korenilištu i to u tri navrata:

Tretiranje	D o z a	F e n o f a z a r a z v o j a k a l e m a
Prvo	45 g/ha "profi" ili 450 g/ha "zelenog"	kada se na lastaru kalema razvije 5 - 6 listova
Drugo	45 g/ha "profi" ili 450 g/ha "zelenog"	10 dana posle prve primene AGROSTEMIN [®] -a
Treće	45 g/ha "profi" ili 450 g/ha "zelenog"	10 dana posle druge primene AGROSTEMIN [®] -a
Svega:	135 g "profi" ili 1 350 g "zelenog"	u sezoni, po hektaru vinograda

Za manju površinu primenjuje se srazmerno manja količina rastvora i srazmerno manja doza preparata.

Preparat se **priprema** na isti način kao i za proizvodnju grožđa, pri čemu se može prskanje kombinovati sa tečnim đubrivima, ili sa sredstvima za zaštitu kalemova od bolesti i štetočina.

c) Primena u matičnjaku loznih podloga

Primena **AGROSTEMIN**[®]-a u matičnjaku loznih podloga pozitivno utiče kako na porast tako i na bolje zdravljenje lastara u loznih podloga što je, inače, važan preduslov za ispoljavanje afiniteta i povećanje procenta I klase kalemova. Prinos reznica se može povećati od **10 - 20 %**.

Primena **AGROSTEMIN**[®]-a se posebno preporučuje za matičnjake u kojima se loza gaji bez naslona, jer se u istim često postavlja problem uspešnog zdravljenja lastara kao repro materijala u proizvodnji loznih kalemova.

Vreme primene, **doza** preparata i **priprema** rastvora je istovetna kao i pri proizvodnji grožđa, odnosno: 10 dana pre cvetanja, 10 dana posle cvetanja i 10 dana pre šarka grožđa. Kao sorta indikator se uzima jedna pozna sorta evropske loze, na primer – rizling italijanski, muskat hamburg itd.

dr Laza Avramov

POTPUNO JE BEZOPASAN ZA LJUDE, ŽIVOTINJE (UKLJUČUJUĆI I PČELE) I PRIRODNU SREDINU;
NE ZAHTEVA POSEBNE MERE HTZ ^{*)}

Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srbije
Rešenje br 321-01-02214/2019-11 od 10.02.2020.

^{*)} Rešenje br 3/2-08-9291/02 od 13.01.03. Saveznog sekretarijata za rad, zdravstvo i socijalno staranje